

Intoxications graves à la colchicine (Colchicine Opocalcium 1 mg et Colchimax) : rappel des règles de bon usage

RISQUES MÉDICAMENTEUX - MÉDICAMENTS - PUBLIÉ LE 29/06/2022

Information destinée aux médecins généralistes, rhumatologues, gériatres, cardiologues, néphrologues, hépatologues, internistes, pharmaciens d'officine, pharmaciens hospitaliers et cadres de santé.

Respectez le schéma posologique recommandé dans l'AMM de ces spécialités ;

Diminuez la posologie chez le sujet âgé (notamment de plus de 75 ans), l'insuffisant hépatique, l'insuffisant rénal ou les sujets à risque d'insuffisance rénale (risques de déshydratation, médicaments concomitants) et assurez un suivi particulier de ces patients ;

Respectez les contre-indications :

chez le sujet insuffisant rénal sévère (clairance de la créatinine < 30 ml/min)

chez l'insuffisant hépatique sévère

Vérifiez les risques d'interactions médicamenteuses ;

N'associez pas la colchicine avec la pristinamycine et les macrolides (hormis la spiramycine) (associations contre-indiquées) ;

informez les patients sur l'importance :

de **respecter la posologie** ;

de **consulter rapidement en cas d'apparition de diarrhée, nausées, vomissements**. Une diminution de la posologie ou un arrêt du traitement devra être envisagé.



Téléchargez le courrier destiné aux professionnels de santé (29/06/2022)
(/uploads/2022/06/29/20220629-dhpc-colchicine.pdf)